



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



Álgebra

Tema: Valor absoluto I

Docente: Segundo Heli Chiroque Reyes

VALOR ABSOLUTO

El valor absoluto de un número real x denotado por $|x|$ se define de la siguiente manera

$$|x| = \begin{cases} x & ; x > 0 \\ 0 & ; x = 0 \\ -x & ; x < 0 \end{cases}$$

Ejemplos

- $|15| = 15$
- $|-8| = -(-8) = 8$
- $|0| = 0$
- $|\sqrt{2}| = -(-\sqrt{2}) = \sqrt{2}$

$$|x| = x$$

positivo

En forma práctica, las barras se eliminan.

$$|x| = -x$$

negativo

En forma práctica, le cambiamos de signo.

- $|x^2 + \pi| = x^2 + \pi$
siempre positivo

Como $x^2 \geq 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$
 $\rightarrow x^2 + \pi \geq \pi$

- $|4^x + 1| = 4^x + 1$
siempre es (+)

Como $4^x > 0$
 $\rightarrow 4^x + 1 \geq 1$

- $||x| + 5| = |x| + 5$
siempre positivo

Como $|x| \geq 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$
 $\rightarrow |x| + 5 \geq 5$

- $|3x^2 - x + 1| = 3x^2 - x + 1$
siempre positivo

Por el Teorema del trinomio Positivo:

- Coef. princ. = $3 > 0$
- $\Delta = (-1)^2 - 4(3)(1)$
 $\Delta = -11 < 0$

PROPIEDADES DE VALOR ABSOLUTO

Considere que cada expresión este bien definida en los reales.

1. $ x \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$	2. $ xy = x y $	3. $ -x = x $
<ul style="list-style-type: none"> $3x - 2 \geq 0; \forall x \in \mathbb{R}$ $x^3 + x \geq 0; \forall x \in \mathbb{R}$ 	<ul style="list-style-type: none"> $8x = 8 x = 8 x$ $x^2 - 2x = x x - 2$ 	<ul style="list-style-type: none"> $-10 = 10 = 10$ $4 - x = -(x - 4) = x - 4$
4. $\left \frac{x}{y}\right = \frac{ x }{ y }; y \neq 0$	5. $ x ^2 = x^2 = x^2$	6. $\sqrt{x^2} = x $
$\left \frac{x+6}{x-2}\right = \frac{ x+6 }{ x-2 }$ $\frac{ x }{ x+3 } = \left \frac{x}{x+3}\right $	$ x-5 ^2 = (x-5)^2$ $(x+9)^2 = x+9 ^2$	$\sqrt{(x-3)^2} = x-3 $ $\sqrt{(-7)^2} = -7 = 7$

Consecuencia :

$$|4x - 8| = 4|x - 2|$$

$$|-5x - 20| = 5|x + 4|$$

$$|a - b| = |b - a|$$

$$\sqrt[n]{x^{2n}} = |x|; \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\sqrt[4]{(x-3)^4} = |x-3|$$

Aplicación 1

Si se cumple que

$$|x^2 - 2x + k| = x^2 - 2x + k; \forall x \in \mathbb{R},$$

halle la variación de k .

- A) $[1; +\infty)$ B) $\langle 1; +\infty)$ C) $[4; +\infty)$
 D) $\langle -\infty; 1]$ E) $\langle -\infty; 1)$

Resolución

Aplicación 2

Se define

$$f_{(x)} = \frac{|2x + 3| - |x - 4|}{x}, x \in \langle 0; 1 \rangle$$

halle la variación de $f_{(x)}$.

- A) $[0; +\infty)$ B) $\langle 2; +\infty)$ C) $[4; +\infty)$
 D) $\langle -\infty; 3]$ E) $\langle -\infty; 2)$

Resolución

ECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

Son ecuaciones donde la incógnita este afectado del valor absoluto.

Ejemplos:

- $|3x - 2| = 5$
- $|x - 2| + |2x - 4| = 6$
- $|x^2 + x - 6| = |2x + 4|$

Tenga en cuenta que:

Como $|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, entonces estas ecuaciones son incompatibles y tienen C. S = \emptyset

- $|3x + 4| = -5$
- $|2x - 1| + |x + 3| = -6$

Resolución de ecuaciones con valor absoluto

Tener en cuenta la definición y propiedades del valor absoluto en el proceso de la resolución de la ecuación para dar el conjunto solución (CS).

Aplicación 3: Resuelva la ecuación

$$|3x - 1| = 8$$

Resolución:

Teoremas

1. $|x| = a \Leftrightarrow a \geq 0 \wedge (x = a \vee x = -a)$

2. $|x| = |a| \Leftrightarrow x = a \vee x = -a$

Aplicación 4: Resuelva la ecuación

$$|x + 1| = 3x - 9$$

Resolución:

Aplicación 5: Resuelva la ecuación

$$|x^2 + x - 6| = |2x - 4|$$

Resolución:

Aplicación 6

Determine la suma de módulos de las soluciones de la siguiente ecuación

$$x^2 + 6x - 9|x + 3| + 29 = 0.$$

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 25 E) 12

Resolución

— ACADEMIA —

CÉSAR

VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe